BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 24 novembre 1897

Présidence de M. A. GROUVELLE.

MM. Bellevoye, de Reims et H. Deckert, de Nantes assistent à la séance.

Admissions. — M. Paul Groult, naturaliste, 46, rue du Bac, Paris. — M. Émile Busigny, 46, rue du Bac, Paris.

Captures. — M. C. Lafaury a capturé cette année plusieurs individus de la *Leucania extranea* Gn., en septembre, tant à Cap-Breton, qu'à Mées-sur-Adour et à Saugnac et Cambran. Cette espèce, nouvelle pour la faune française, a été décrite en 1856 par Guénée (t. I, p. 77), sur des sujets provenant de l'Amérique septentrionale, du Brésil et de la Colombie. Elle a été prise depuis, d'après M. A. Constant, à Madère et au sud de l'Angleterre, où elle était considérée comme adventive.

Communications.

Sur le terrier de la larve de *Cicindela hybrida* L. [Col.]

Par P. Lesne.

D'après les observations faites jusqu'ici, on sait que les larves de Cicindèles établissent d'habitude leur terrier en sol horizontal et que ces terriers sont simplement des sortes de cheminées verticales. J'ai eu l'occasion, au mois d'août dernier, d'observer un mode d'édification spécial des terriers des larves de *Cicindela hybrida* L.

Sur la route qui conduit de la gare au village d'Andelot (Jura) se trouvent quelques carrières peu activement exploitées d'où l'on extrait du calcaire. Celui-ci est recouvert d'une assise argileuse meuble qui s'éboule aux endroits à pic et forme de petits talus coniques que les pluies tassent et rendent consistants. Dans ceux de ces talus exposés au midi, les larves de Cicindèles se sont installées en nombre ;

mais, au lieu de conserver à leurs terriers une entrée en forme de simple trou circulaire, elles en ont pour la plupart modifié le pourtour d'une façon qui paraît assez ingénieuse. Au-dessous de l'orifice arrondi que la larve, à l'affût, ferme de sa tête et de son prothorax, le



sol a été creusé en une sorte de godet surplombé par l'entrée de la galerie souterraine; au-dessus, de la terre tassée méthodiquement ainsi que l'indiquent de nombreuses traces de sillons concentriques, forme une espèce de collerette à bords irréguliers.

Il est difficile de connaître d'une manière exacte, autrement que par l'observation directe, l'usage que fait la larve de l'excavation annexée à l'entrée de sa galerie. Le simple jeu de trappe, pratiqué par les larves établies en sol horizontal, n'a plus les mêmes chances de succès sur un sol fortement incliné. Que les insectes grimpant ou glissant le long du talus se trouvent arrêtés dans cette cavité, ou bien que la larve, placée dans des conditions différentes, ait modifié sa tactique, il ne semble pas douteux que ce dispositif ne favorise la capture des proies. Quant à la collerette supérieure, son rôle doit être d'empêcher l'irruption dans le terrier des eaux pluviales qui ruissellent à la surface du talus.

Description d'une espèce nouvelle de *Leptopodinae* [Hém.]

Par Joanny Martin.

Erianotus madagascariensis n. sp. — Long. 4,5; larg. 1,5 mill. — Corps de forme allongée, noir, épineux sur toute sa surface sauf les yeux. Milieu de la tête, en avant des yeux, brun, les côtés testacés. Tubercule ocellaire jaune en arrière. Pronotum divisé en deux parties par un léger sillon transverse; la partie antérieure munie de petits tubercules épineux; sur le sillon, et s'étendant très peu en arrière, cinq

petites crêtes noduleuses, une médiane et deux de chaque côté; les premières latérales jaunes. Pronotum à partie postérieure fortement ponctuée; bord antérieur, moitié postérieure des bords latéraux confluente avec le tiers du bord postérieur et une petite tache médiane sur ce bord, jaunes. Écusson noir à sommet jaune. Élytres brun-noir ponctués de très fines macules jaunâtres. Suture scutellaire jaune. Une tache allongée de même couleur, tangente intérieurement à la suture du clavus et près de sa base; sommet du clavus jaunâtre. Corie avec six grandes taches jaunes : deux accouplées près de la base, une médiane et deux ou trois autres rassemblées au sommet; marge élytrale flave, transparente, bordée extérieurement de fines épines très régulièrement espacées. Membrane brune avec quelques taches flaves entre les nervures. Dessous du corps brunâtre. Antennes à premier article court et épais; les autres longs et filiformes, bruns. Articles deux et trois égaux. Rostre jaune testacé, armé de longues épines dressées. Portion basilaire et les deux derniers articles brunâtres. Pattes antérieures fortes, tachées de brun en dessus, flaves en dessous; fémurs et tibias armés, au côté interne, de deux séries de longues épines dressées. Extrémité du tibia noire. Pattes postérieures longues et grêles, brunes en dessus. Abdomen flave; bords des segments noirs.

Madagascar. Deux exemplaires (*Grandidier* 1894). — Coll. du Muséum de Paris.

Cette nouvelle espèce se rapproche à certains égards d'*Erianotus lanosus* Duf. C'est ainsi que les fines ponctuations jaunes, *Halbdecken perforat* (Fieber, Europ. Hem., p. 149, 1861), les grandes taches des élytres semblablement disposées, donnent à ces deux espèces un aspect presque identique; mais les épines de la surface du corps et de la marge élytrale de notre espèce permettent de la distinguer nettement de *E. lanosus*.

Les collections du Muséum renferment trois exemplaires de cette dernière espèce; l'un donné par Léon Dufour en 1834; un autre dans la coll. G. Fallou sans indication de provenance et enfin un dernier recueilli en Algérie (Philippeville), par M. H. Lucas.

La présence de cette espèce en Afrique n'étant pas indiquée dans les catalogues, j'ai cru bon de la signaler ici.

Remarquable aberration du *Parnassius Apollo* L. [Lép.] capturée dans le Jura français

Par H.-F. Deckert.

♂ Blanc légèrement verdâtre, ailes supérieures plus élancées que celles de l'*Apollo* ordinaire, les ailes inférieures plus elliptiques. Les taches discoïdales des ailes supérieures sont moins grandes et la deuxième se termine, vers la nervure costale, par une sorte de crochet bien caractérisé dans les deux taches. Les taches costales font complètement défaut; l'anté-marginale est à peine indiquée par de très vagues arceaux; la marginale, bien transparente, s'arrête vers la deuxième branche de la médiane. Les taches du bord interne n'existent point. Aux ailes inférieures, d'un blanc verdâtre uniforme, les ocelles supérieurs sont remplacés par deux taches noires de moyenne grandeur, les ocelles inférieurs, situés comme ceux de l'*Apollo* ordinaire, sont aussi plutôt des taches, et présentent, celui de gauche des écailles d'un rouge jaunâtre, celui de droite à peine quelques traces indiquant la présence d'écailles de même couleur. Le bord abdominal est beaucoup moins estompé de noir, et, dans l'angle anal, on peut remarquer les traces d'une seule tache.

Le dessous des ailes supérieures présente les deux taches discoïdales et quelques écailles noires à la place des taches du bord interne; aux ailes inférieures, les ocelles supérieurs, très réduits, ont quelques écailles du même rouge jaunâtre, alors que les ocelles inférieurs, de vrais ocelles, et de même couleur, sont semblables sur chaque aile. Les deux taches anales existent faiblement indiquées, les taches de la base vagues, sont également écaillées de rouge jaunâtre. Les antennes et le corps comme chez l'*Apollo* ordinaire. — Envergure 73 mill.

Ce remarquable papillon paraît ne pas être une aberration isolée du *Parnassius Apollo*. Il en existe en effet un autre sujet, capturé en Silésie, il y a quelque vingt-cinq ans, et offert à Felder qui en donna la description et le dessin dans son ouvrage « Novara Lepidoptera » (page 135, tab. XXI, fig.), publié de 1864 à 1867. Sa collection est aujourd'hui à Londres. Je dois à M. Charles Oberthür d'avoir pu sans hésitation définir notre *Parnassius;* avant de le lui soumettre, je lui en communiquai un dessin, et le papillon de Felder lui revint immédiatement à la mémoire. Les deux sujets diffèrent cependant quelque peu. Ainsi chez celui de la collection Felder, un ♂ aussi, on constate une absence totale de rouge sur les deux côtés des ailes;

les taches du bord interne sont indiquées en dessus, non en dessous, au contraire du nôtre. Point de taches anales; absence totale également, d'après le dessin, des taches de la base et de l'ocelle supérieur. La situation des ocelles diffère aussi quelque peu. Le reste est semblable. Ces deux Papillons, on le voit, quoique pris à des époques si éloignées et dans des localités très différentes, semblent bien constituer une aberration constante, mais extrêmement rare, du *Parnassius Apollo.* Jusqu'à présent, en effet, ils paraissent être les deux seuls sujets signalés. L'exemplaire que j'eus l'heureuse chance de capturer, fait partie de quelque 150 *Apollo* pris, les 27, 29 et 30 juillet, dans le Jura français, aux environs de Pontarlier, à une altitude variant de 860 à 1.000 ou 1.200 mètres.

Description de deux Coléoptères nouveaux du sud de l'Algérie

Par le Dr A. Chobaut.

Anthrenus (Anthrenops) bellulus n. sp. — En ovale allongé, faiblement convexe en dessus et en dessous. Tête petite, triangulaire, rabattue en avant et en bas, avec la face aplatie, couverte comme le restant du corps de squamules arrondies en arrière et pointues en avant, une fois et demie à deux fois aussi longues que larges, ces squamules noires sur le front et blanches sur la face. Antennes de neuf articles, logées dans une cavité placée en dessous des yeux et prolongée sur les côtés du prothorax; 1er article sphérique, 2e sphérique également, un peu plus gros, 3e à 6e plus petits que les précédents, globuleux, égaux entre eux, 7e à 9e formant une massue piriforme avec le gros bout tourné vers l'extrémité, le dernier beaucoup plus gros et plus long que les deux autres pris ensemble. Pronotum transverse, fortement rétréci en avant, à bord antérieur concave, à côtés rectilignes, divergents en arrière, à bord postérieur formant un angle obtus saillant vers la suture élytrale, recouvert de squamules blanches sur toute sa surface, à l'exception du milieu du bord antérieur où elles sont noires. Écusson imperceptible. Élytres une fois et demie environ aussi longs que larges pris ensemble, arrondis aux épaules, puis presque parallèles sur environ la moitié de leur longueur, finalement arrondis ensemble en arrière, garnis de gros points peu profonds, peu réguliers, où s'insèrent les squamules, celles-ci d'un brun plus ou moins noirâtre sur toute leur étendue à l'exception de deux bandes transversales communes où elles sont blanches et quelques-unes jaunes; la bande antérieure part de l'écusson, se dirige en arrière et en dehors, puis s'élargissant en

dessus de l'épaule, va atteindre le bord externe auquel elle est perpendiculaire; la bande postérieure part de l'apex, remonte le long de la suture sur un tiers environ de son étendue, puis se dirige en haut et en dehors, redescend ensuite un peu en se rétrécissant et finalement va atteindre le bord externe où elle s'épanouit largement. Pattes testacées avec les tarses d'un brun foncé. Dessous blanchâtre. — Long. 1,6-2 mill.

Cette espèce a été prise pour la première fois, à ma connaissance, à Aïn-Sefra, en juin 1896, par M. L. Bleuse; M. Dion, pharmacien-major de l'armée, l'a reprise à Mecheria en juillet de la même année; j'ai eu le plaisir de la capturer moi-même, dans la dernière quinzaine de mai dernier, à Ghardaïa; enfin mon ami M. Bayonne l'a retrouvée dans l'oasis de Berriane au commencement de septembre de cette année. Elle est donc propre au sud et au sud-ouest de l'Algérie. Elle se trouve à l'état adulte sur diverses fleurs, mais surtout sur des fleurs d'Ombellifères. — (Types : *coll. Abeille de Perrin, Bedel, Vauloger, du Muséum d'Hist. nat. de Paris et la mienne.*)

A. bellulus appartient par ses antennes de neuf articles au sous-genre *Anthrenops* Reitt. Sa coloration tout à fait particulière, remarquable surtout par les deux seules bandes blanches des élytres, la distingue des autres espèces de ce sous-genre, *minor* Woll. (= *albido-flavus* Reitt.), *subclaviger* Reitt., *coloratus* Reitt., *zebra* Reitt. et var. *tigrinus* Reitt., *amoenulus* Reitt., que j'ai toutes en collection. Elle est assez voisine de la dernière (*amoenulus* Reitt.), mais sa forme plus allongée et son dessin bien différent l'en séparent nettement.

La coloration d'*A. bellulus* varie un peu selon les individus et surtout selon leur état de fraîcheur. C'est ainsi que la tache brune de la partie antérieure du corselet est plus ou moins étendue, que la bande blanche postérieure des élytres envoie souvent un petit prolongement vers la partie externe de la bande antérieure, etc. Somme toute, ces variations se réduisent à peu de chose.

Attalus mozabita n. sp. — ♂ Large, court, brillant, recouvert partout d'une fine pubescence blanchâtre couchée, avec des poils noirs, longs, dressés sur tout le corps. Tête petite, triangulaire, concave entre les yeux, noire. Labre et épistome noirs. Mandibules roussâtres, noires à la pointe. Palpes maxillaires noirs, à dernier article légèrement tronqué au bout. Antennes dépassant de beaucoup la base des élytres, grêles, noirâtres à l'exception des quatre articles basilaires roussâtres, dentées fortement à partir du 4e article, à articles toujours plus longs que larges à partir du 3e, avec ce dernier allongé, en forme de fer de

lance. Pronotum faiblement transversal, arrondi sur les côtés, moins large que les élytres, noir avec une bordure périphérique rougeâtre incomplète seulement en avant. Élytres déprimés, enfoncés le long de la suture, avec une ponctuation forte et serrée qui finit par disparaître au sommet, à intervalles rugueux, d'un noir métallique à l'exception du quart postérieur de la suture qui est rougeâtre; cette couleur occupe largement l'apex et remonte tout le long du bord latéral en formant près du milieu une tache qui s'avance jusque vers la moitié de la largeur de l'élytre. Ventre rougeâtre avec la base de chaque segment largement noire. Poitrine noire. Pattes rougeâtres avec les cuisses postérieures noires et le dessus des quatre autres plus ou moins noirâtre, ou simplement avec la partie supérieure de tous les fémurs noirâtre. — ♂ Antennes plus courtes, atteignant presque la base du corselet, faiblement dentées à partir du 5e article. — Long. 2-2,6 mill.

Cette espèce a été capturée à Ghardaïa (Mzab), par mes amis MM. Bayonne et Aubert, en octobre 1897, sur des fleurs de *Foeniculum officinale* All. — (Types : *coll. Abeille de Perrin, Bedel, Vauloger, du Muséum d'Hist. nat. de Paris, la mienne*).

La coloration de cette espèce m'a semblé variable sur les nombreux individus que j'ai examinés. Les antennes et les pattes sont plus ou moins noirâtres, les côtés du corselet plus ou moins rougeâtres, la tache latérale des élytres plus ou moins étendue vers la suture, etc.

Elle est voisine d'*Att. perforatus* Ab., mais elle s'en distingue sans peine par sa forme plus large; sa coloration où le rouge est plus vif et le noir métallique plus étendu; ses antennes plus grêles, plus fortement pectinées; sa tête plus petite; son corselet plus développé, moins transversal; sa pubescence double; sa ponctuation élytrale plus forte et plus serrée; etc.

A. mozabita et *A. bizonatus* Ab. (décrit d'Aïn-Sefra et retrouvé par moi au Mzab, sur les fleurs du Jujubier sauvage) sont les deux seuls Malachides capturés jusqu'à ce jour dans cet étrange pays.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1897, II, 19 et 20. — L. Dubois : Sur une Bactérie pathogène pour le *Phylloxera* et pour certains Acariens.

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), octobre 1897. ⊙

Agricultural Gazette of N. S. Wales, VIII, 9, 1897. — A. Gale : Influence of Bees on Crops.

Association of Economic Entomologists (*Proceedings of the ninth Annual Meeting.*), 1897. — F.-M. Webster : The present and future of applied Entomology in America. — L.-O. Howard : Additional Observations on the Parasites of *Orgyia leucostigma*. — Temperature Experiments as affecting received ideas on the Hibernation of Injurious Insects. — F.-H. Chittenden : Notes on certain Species of Coleoptera that attack useful Plants. — T.-D.-A. Cockerell : An experience with Paris green. — W.-B. Barros : The present Status of the San Jose Scale in Michigan. — F.-M. Webster : On the Origin and Distribution of the Chinch Bug. — C.-P. Gillette : Vernacular Names of Insects. — C.-P. Lounsbury : Notes on Cape-of-Good-Hope Insects. — L.-O. Howard : A useful American Scale Insect. — F.-W. Webster and C.-W. Mally : Insects of the year in Ohio. — A.-H. Kirkland : On the Preparation and use of Arsenate of Lead. — Notes on the Malodorous Carabid, *Nomius pygmeus* Dej. — C.-L. Marlatt : Notes on Insecticides. — F.-H. Chittenden : The Bean Leaf-Beetle (fig.). — A.-B. Cordley : Notes on *Anarsia lineatella* Zell. — C.-P. Gillette : A successful Lantern Trap (fig.). — Oviposition in young Forest Trees by *Tetraopes femoratus* Fab. — A few Insects that have been unusually abundant in Colorado this year. — W.-M. Schöyen : Notes on Insects of Norway and Sweden. — W.-G. Johnson : Notes from Maryland on the principal injurious Insects of the Year. — Notes on Some little known Insects of economic Importance.

Berliner Entomologische Zeitschrift, 1897, 1 et 2. — H. Fruhstorfer : Aufzählung der von mir auf der Insel Lombok, im Jahre 1896 gefangenen Rhopaloceren. — Eine neue *Delias* von Flores. — Eine neue *Euploea* aus Borneo. — J.-J. Kieffer : Nachtrag zu den Zoocecidien Lothringens. — Th. Becker : Dipterologische Studien, V, (pl.). — C. Schaufuss : Borkenkäfer-Studien. — H. Fruhstorfer : Neue Rhopaloceren aus dem malayischen Archipel. — Rhopalocera Lombokiana. — L. de Nicéville : Note on Javan Lepidoptera Rhopalocera. — L. Biro : Biologische Mittheilungen aus New-Guinea. — Briefliche Mittheilung des Prof. Dr. Jhering in Sao-Paulo Brasilien an den Herausgeber.

Canadian Entomologist (*The*), XXIX, II, 1897. — H.-H. Lyman : Notes on the Life-history of *Colias interior* Scud. — Rev. T.-W. Fyles : The Life-history of *Epirranthis obfirmaria* Hbn. — N.-H. Ashmead :

Descriptions of five Genera in the Family Cynipidae. — S.-N. Dunning : Another new Species of *Protandrena* Ckll. — T.-D.-A. Cockerell : Some new and little-known Coccidae collected by Prof. C.-H.-T. Townsend in Mexico. — Dwight Brainerd : Early stages of *Brephos infans*.

Cidre et le Poiré (*Le*), IX, 7, 1897.⊙

Entomologische Nachrichten, XXIII, 22, 1897. — H. Höppner : Ueber die bei Freissenbüttel vorkommenden Farbenvarietäten des *Bombus soroensis* F. — Kriechbaumer : *Mesochorus gigas* nov. sp. — F. Förster : Beiträge zur Kenntniss des indo-australischen Odonatenfauna, VI. — G. Breddin : Studia hemipterologica, I.

Frelon (*Le*), VI, 6, 1897 (2 exempl.). — J. Desbrochers des Loges : Espèces inédites de Curculionides.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, II, 43, 1897. — Dr. Chr. Schröder : Der Ringelspinner, *Bombyx neustria* L. (fig.). — Prof. K. Sajó : Das Auftreten einiger Insekten in Städten und auf dem Lande. — Prof. Dr. Rudow : Beobachtungen an Bauten und Nestern von Hymenoptera. — Dr. Vogler : Nachträgliches ueber die *Anthrenus*-Larven.

Instructor (*El*), XIV, 6. 1897.⊙

Intermédiaire des Biologistes (*L'*), I. 1, 1897.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen der*), XLVII, 8, 1897. — Dr. A. Stener : Ein Beitrag zur Kenntniss der Cladoceren und Copepodenfauna Kärntens (fig.). — A. Handlirsch : Zur systematischen Stellung der Hemipterengattung *Phimophorus* Bergroth (fig.). — L. Ganglbauer : Neue *Cryptophagus* aus den mitteleuropaïschen Faunengebiete.

Museo civico di Storia naturale di Genova (*Annali*), XXXVII, 1897. — A. Grouvelle : Potamophilides, Dryopides, Helmides et Hétérocérides des Indes Orientales. — F. Silvestri : Chilopodi e Diplopodi raccolti da Don Eugenio dei Principi Ruspoli durante l'ultimo suo viaggio nelle regioni dei Somali e dei Galla. — E. André : Études sur les Mutillides existant dans les Collections du Musée Civique de Gênes. — Ch. Kerremans : Buprestides recueillis par M. le Cap. V. Bottego dans le pays des Somalis. — A.-L. Montandon : Hémiptères de la s.-fam. des *Plataspidinae* récoltés par MM. Loria et Modigliani en Océanie et conservés au Musée Civique de Gênes. Notes et descriptions d'espèces nouvelles. — M. Jacoby : List and descrip-

tions of the Phytophagous Coleoptera obtained by Dr. Modigliani from Mentawei Islands. — E. Wasmann : Neue Termitophilen und Termiten aus Indien, IV. — C. Emery : Formiche raccolte dal Cap. V. Bottego nella regione dei Somali. — T. Thorell : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. LXXIII. Secondo saggio sui Ragni birmani. — W. Horn : Sur une nouvelle espèce de *Euryoda* recueillie par M. le Cap. V. Bottego dans le pays des Somalis. — Cicindélides nouvelles du Musée Civique de Gênes. — E. André : Liste des Mutillides recueillis au pays des Somalis par M. le Cap. V. Bottego et description de deux espèces nouvelles. — J. Schmidt : Histeridae auf Sumatra gesammelt von Dr. E. Modigliani. — F. Silvestri : Chilopodi e Diplopodi raccolti dal Cap. V. Bottego durante il suo secundo viaggio nella regione dei Somali e dei Galla. — P. Magretti : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. LXXIV. — Imenotteri, II, Trigonalidi, Betilidi, Crisididi, colla descrizione di parecchie nuove specie. — E. Fleutiaux : Sur quelques espèces de *Trixagidae* exotiques appartenant au Musée Civique de Gênes (fig.). — M. Jacoby : On some species of Phytophagous Coleoptera collected by Cap. V. Bottego in central and Southern Somaliland. — A.-L. Montandon : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. LXXV. — Hemiptera cryptocerata. — W.-L. Distant : Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale. XVII. — Additions to our Knowledge of the Cicadidae of New Guinea. — Descriptions of new genus and species of Cicadidae collected by Dr. Modigliani at Mentawei Island. — L. Fea : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. LXXVI. — Riassunto generale dei risultati zoologici (fig.).

Naturaliste (*Le*), 15 novembre 1897. — P. Chrétien : Premiers états de la *Tortrix Grotiana*. — M. Pic : Description de Longicornes de la région Causasique. — L. Planet : Description de quelques Lucanides nouveaux (fig.).

Psyche, VIII, 259, 1897. — W.-H. Ashmead : Notes on some European Hymenopterous parasites of the Hessian-Fly (*Cecidomyia destructor* Say), and other insects bred by Dr. P. Marchal, the French government Entomologist, I. — C.-H. Tyler Townsend : Diptera from the White Sands, on the Tularosa plains of southern New Mexico, I. — S. Henshaw : Bibliographical Notes. — T.-D.-A. Cockerell : Two forms of *Prodoxus coloradensis* Riley. — Weeds Life Histories.

Reale Accademia dei Lincei (*Atti*), 1897, II, 9.⊙

Revue éclectique d'Apiculture mensuelle, IV, 11, 1897.

Revue scientifique, 1897, II, 20, 21. — Gynandrie chez un Papillon. — Entomologie pratique. — Mœurs des Hyménoptères Gastrilégides.

Royal Society of Canada (*Proceedings and Transactions*), ser. II, 2, 1896.⊙

Sociedad española de Historia natural (*Actas*), octobre 1897. — J.-M. DE LA FUENTE : Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real; IV, Hemipteros. — RIVAS MATEOS : Una excursion à la Sierra de Bejar (Prov. de Cáceres, Salamanca y Avila).

Società romana per gli Studi zoologici (*Bollettino*), VI, 1-2, 1897. — C. DE LEO : Nuove aggiunte agli Ortotteri della Provincia di Roma (fig.).

Societas entomologica, XII, 16, 1897. — Dr L. HEISSLER : *Erebia gorge* var. *triopes* spr.?. — A. GRUNACH : Entomologische Exkursionen in den siebenbürgisch-rumänischen Randgebirgen. — W. GEHHARD : Beiträge zur « Fauna Baltica » speziell die Lokalfauna von Libau und Umgegend betreffend. — A. DAUSCHA : *Arctia fasciata* ohne Ueber- winterung. — V. TIEDEMANN : *Vanessa cardui*.

Société d'Histoire naturelle de Mâcon (*Bulletin*), VII, 1897.⊙

Société entomologique de Belgique (*Annales*), XLI, 9, 1897. — A. FOREL : Communication verbale sur les mœurs des Fourmis de l'Amérique tropicale. — V. DEPREZ : Principaux Insectes nuisibles au tabac de la Semois (fig.). — M.-J. BELON : Remarques sur le genre *Euryptera* Serv., du groupe des Lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. — M. PIC : Premier Supplément à ma liste des Anthicides. Addenda. — F. SILVESTRI : Description des espèces nouvelles de Myriapodes du Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles (fig.).

Természetrajzi Füzetek, XX, 4, 1897. — Dr O. SCHMIEDEKNECHT : Die Ichneumoniden-Gattung *Hemiteles* mit einer Uebersicht der europäischen Arten. — C. EMERY : Formicidarum species novae vel minus cognitae in collectione Musaei Nationalis Hungarici quas in Nova-Guinea, colonia germanica collegit L. Biró (pl.). — V. SZÉPLIGETI : *Cephaloplites*, novum genus Braconidarum. — F.-W.-KONOW : Systematische und kritische Bearbeitung der Siriciden-Tribus *Oryssini*. — Dr C. KERTÉSZ : Dipterologisches aus Neu-Guinea (fig.). — *Psilocephala laticornis* LW. — *Loxoneura facialis* n. sp. (fig.). — Dr G. HORWATH : Homoptera nova ex Hungaria. — A. MOCSÁRY : Hymenoptera nova e fauna hungarica.

Zoological Record, XXXIII, 1896.

ANONYME : Doryphora ou Colorado (*Doryphora decemlineata*). Insecte destructeur de la Pomme de terre. (*Dir. Agr.*), 1877, 8 p. 1 pl. col. — Don de M. L. Bedel.

BRÖLEMANN (H.-W.) : Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. (*Feuille J. Nat.*), 1897, 11 p. (fig.).*

ID. : Un mystérieux Myriapode, *Scolopendropsis Bahiensis* Brandt. (*Bull. Soc. zool. Fr.*), 1897, 5 p.*

ID. : Myriapodes provenant des campagnes scientifiques de « l'Hirondelle » et de la « Princesse Alice ». — Myriapodes recueillis à Madère par S. A. S. le Prince de Monaco (*loc. cit.*), 8 p., fig.*

ID. : Myriapodes recueillis en Indo-Chine par M. Pavie et offerts au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. — Note préliminaire. (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1896, 2 p. fig.*

ID. : Iulides d'Algérie. (*Ann. Sc. nat.*), 24 p. 2 pl.*

COQUILLETT (D.-W.) : Revision of the Tachininae of America North of Mexico, a parasitic two-winged Insects. (*U. S. Dep. Agr.*), 1897, 154 p.*

GENNADIUS (P.-G.) : Report of the Agriculture of Cyprus, III. Nicosia, 51 p., fig.*

GROUVELLE (A.) : Clavicornes nouveaux des Indes orientales et pays voisins. (*Ann. Mus. civ. Genova*), 1897, 57 p.*

HEYDEN (L. v.) : Insecta Coleoptera, Hymenoptera, Diptera. (*Abh. Senckenb. naturf. Gesells.*) 1897, 57 p.*

JANET (CH.) : Études sur les Fourmis et les Abeilles, XIII. — Sur le *Lasius mixtus*, l'*Antennophorus Uhlmanni*, etc. Limoges, 1897, 62 p., fig.*

ID. : Les Fourmis. Bruxelles, 1897, 56 p., fig.*

MOCKRZECKY (S.) : Sur une nouvelle espèce d'Aphidien trouvée en Crimée sur les racines de la Vigne. (*Hor. Soc. Ent. Ross.*), 1897, 4 p., fig.*

ID. : Deux opuscules entomologiques en langue russe, 1897, 6 p., fig.

MONTANDON (A.-L.) : Hémiptères-Hétéroptères de l'Équateur, trois espèces nouvelles de la fam. des *Coreidae*. (*Bull. Soc. Sc.*), Bucarest 1897, 6 p.* — Don de M. L. Bedel.

A. L.

Le Gérant : PH. FRANÇOIS.